

# CHIRURGIA GENERALE

## APPENDICITE

L'appendicite , cioè l'infiammazione della appendice ciecale, può essere cronica o acuta. Nel primo caso è possibile un trattamento medico monitorato nel tempo mentre nel secondo è necessario un intervento chirurgico d'urgenza .

L'appendicite acuta si manifesta con dolore addominale importante, febbre , nausea e possibile vomito e la terapia chirurgica è eseguita con tecnica laparoscopica; tale metodica con 3 piccoli fori permette attraverso la visione data dalla telecamera non solo di eseguire l'atto chirurgico nel migliore dei modi ma anche di visionare come primo atto il campo addominale in "toto"; ad esempio è possibile scoprire la presenza di eventuali cisti ovariche, torsioni dell'ovaio, diverticoli di Meckel cioè tutte quelle situazioni che possono essere causa di una errata diagnosi, ma che simulano esattamente il quadro di appendicite acuta.

Pertanto con la laparoscopia è possibile essere certi della diagnosi e in caso di riscontro di diversa patologia intervenire se fosse necessario per un intervento "mirato" sul caso. Molto frequentemente utilizzo per tale metodica materiale percutaneo, cioè senza nemmeno la necessità dei fori (trocar) d'entrata con un risultato estetico eccezionale