



# CHIRURGIA GENERALE

## CALCOLOSI DELLA COLECISTI



Patologia molto frequente è rappresentata dalla presenza di calcoli all'interno della colecisti o cistifellea, un sacchetto che ha la funzione di raccogliere la bile prodotta dal fegato.

La colelitiasi è detta, in inglese, malattia delle quattro F: Female, Fat, Fertility, Fourty. Sono infatti le donne in età fertile (intorno ai 40 anni) ad essere più a rischio ma anche altri fattori influenzano tale patologia come ad esempio il diabete, il sovrappeso, la dislipidemia (aumento della concentrazione di colesterolo e trigliceridi nel sangue), l'ipertensione etc

La calcolosi della colecisti può rimanere senz.a sintomatologia ma anche determinare dolori importanti detti coliche biliari caratterizzate, oltre che dal dolore in regione addominale centrale, lato dx e scapola dx, da nausea, vomito biliare etc.

Inoltre può essere causa di importanti complicanze come ad esempio l'ittero per il passaggio di calcoli nel coledoco, la colecistite, la presenza di materiale purulento nel sacchetto biliare, fino anche alla pancreatite e al cancro della colecisti.

La diagnosi oggi è facilmente ottenibile con un esame ecografico.

In caso di colica appare necessario l'intervento di colecistectomia laparoscopica che dura circa 20-30 minuti e necessita di un ricovero di 24 ore.