

# CHIRURGIA GENERALE

## PATOLOGIE COLO RETTALI

### MALATTIA DIVERTICOLARE



La malattia diverticolare è determinata dalla presenza di estroflessioni (definiti diverticoli) a carico della mucosa e della sottomucosa lungo la parete degli organi cavi di tutto il tubo digerente; in particolare essi si verificano dopo i 50 anni di età specialmente a carico del colon sinistro e specie a carico del sigma dove è maggiore la debolezza dello strato muscolare.

La diagnosi avviene molto frequentemente in modo casuale a seguito di un esame colonscopico eseguito per altri motivi e questo spiega come la malattia diverticolare sia molto spesso silente nella sintomatologia. Tuttavia talvolta essi provocano dolori addominali specie nei quadranti inferiori con alvo alternato (stipsi e diarrea) e saltuariamente presenza di sangue nelle feci. Il perdurare di questa sintomatologia se non controllata adeguatamente con terapia medica può portare a infiammazione dei diverticoli con possibile rottura degli stessi, ascessualizzazione e peritonite.

Compito del chirurgo è monitorare attentamente la situazione clinica dei pazienti con diverticoli al fine di comprendere quando la terapia medica non possa più soddisfare le esigenze di tranquillità clinica e decidere quindi per un trattamento chirurgico.

La terapia chirurgica della malattia diverticolare non complicata è ancora una volta di tipo laparoscopico e grazie a questa metodica è possibile asportare il tratto di colon infiammato con 4 o 5 piccoli fori.